



СПИД

Возбудитель: ВИЧ

(вирус иммунодефицита человека).

Симптомы:

- ВИЧ поражает клетки иммунной системы;
- выявить ВИЧ можно только через 3-6 месяцев после заражения по выработанным за этот период антителам;
- пока ВИЧ-инфекция не перешла в стадию СПИДа (этот период может длиться более 12 лет), человек может выглядеть и чувствовать себя здоровым и продолжать заражать других;
- стадия СПИДа длится не более 3 лет;
- полностью излечиться от ВИЧ пока невозможно, вакцины от ВИЧ пока нет.



Что делать, чтобы не заболеть?

- пользоваться презервативом при любом сексуальном контакте;
- иметь постоянного полового партнера;
- не употреблять наркотики;
- вести здоровый образ жизни.

По поводу ИППП следует обращаться к врачам следующих специальностей:

- дерматовенеролог;
- гинеколог (для женщин);
- уролог (для мужчин).

Не лечитесь самостоятельно!

О факте ИППП сообщите партнеру!

До окончания лечения воздержитесь от секса!

Помните, что все ИППП, кроме ВИЧ, практически излечимы, если лечение начато своевременно!



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БУЗ УР «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ МЗ УР»

**Немного о том,
что должен знать каждый**



**ИНФЕКЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
(ИППП)**

Для многих секс – часть длительных прочных отношений, но некоторые имеют сексуальные контакты без устойчивых взаимоотношений с партнером.

Чтобы помочь обезопасить Вашу сексуальную жизнь, поговорим о профилактике инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Что такое ИППП?

ИППП – ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРИ ЛЮБОМ ВИДЕ ПОЛОВОГО КОНТАКТА. РЯД ИЗ НИХ (ГЕПАТИТЫ, ВИЧ И СИФИЛИС) ПЕРЕДАЮТСЯ ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ КРОВЬ. ИППП – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ И СЕКСУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ.



ГОНОРЕЯ

Возбудитель: гонококк.

Симптомы:

- желтовато-зеленоватые выделения из половых органов;
- отек, боль и жжение при мочеиспускании;
- боли в животе и половых органах;
- может поражать глаза, рот, глотку.

СИФИЛИС

Возбудитель: бледная трепонема.

Симптомы:

- 1 стадия:** безболезненные язвочки на месте внедрения трепонемы; увеличение лимфоузлов;
- 2 стадия:** периодическая сыпь, лихорадка, усталость, боль в суставах;
- 3 стадия:** поражение костей, суставов, головного и спинного мозга.

ГЕРПЕС

Возбудитель: вирус герпеса.

Симптомы:

- зуд;
- жжение;
- покраснение;
- боли при мочеиспускании;
- появление маленьких пузырьков, которые вскрываются, и на их месте образуются язвочки;
- симптомы могут исчезнуть и появиться вновь;
- вирус в организме остается на всю жизнь.

КОНДИЛОМАТОЗ

Возбудитель: вирус папилломы.

Симптомы:

- появление на слизистой оболочке половых органов и заднего прохода светло-розовых разрастаний в виде бородавок, которые вызывают зуд, жжение;
- боль при мочеиспускании и половом контакте.

ГЕПАТИТ В и С

Возбудитель: вирус гепатита.

Симптомы:

- пожелтение кожи, белков глаз, языка;
- потемнение мочи;
- обесцвечивание кала до цвета белой глины;
- боли в правом подреберье;
- снижение аппетита, усталость;
- если не лечить, приводит к циррозу печени.

ХЛАМИДИОЗ

Возбудитель: хламидия.

Симптомы:

- проходит бессимптомно у 60 % женщин и 30 % мужчин;
- редко боли при мочеиспускании;
- боли внизу живота через месяц после заражения;
- может поражать глаза;
- приводит к бесплодию.